

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

- Lea cuidadosamente las instrucciones.
- Al manejar y aplicar el producto, use playera de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, lentes con protección lateral hermética o careta facial protectora, botas y guantes de neopreno.
- Después de un día de trabajo: Lave la ropa y equipo de protección con agua caliente y detergente, por separado de otra ropa.
- Todos los usuarios deberán: Lavarse las manos antes de comer, fumar o beber, mascar chicle o tabaco o usar el baño. Antes de quitarse los guantes, lavarlos bien con agua y jabón.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”:

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”.

PRIMEROS AUXILIOS:

Retire a la persona del lugar contaminado, asegúrese de que respira sin dificultad. Si el producto ha sido ingerido: llame inmediatamente a un médico. Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Si hubo contacto cutáneo: Quite la ropa contaminada y lave la piel con agua corriente y jabón (póngase guantes). Si hubo contacto ocular: Mantenga los párpados abiertos y lave los ojos con agua limpia durante 15 minutos. La inhalación es poco probable, si sucede: Saque al afectado de la zona contaminada, tráaslédelo al aire libre y manténgalo en reposo. “Si persisten las molestias consulte a su médico”.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo Químico: Esteroles.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: TERAD₃ BLOX es un inhibidor metabólico, que al consumo induce un exceso de metabolitos de calcio, causando diferentes desórdenes fisiológicos. Su ruta principal de entrada es por ingestión: causa hipercalcemia, anorexia, náusea, vómito, pérdida de apetito, sed extrema, letargo, diarrea, sudoración abundante y dolor de cabeza. Vía dérmica, puede causar irritación leve. Vía inhalatoria es poco probable o no sucede.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO:

No se conoce un antídoto, aplicar tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCA”.

GARANTÍA: SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V., sólo responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transporte, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro alcance.

“USO AGRÍCOLA”

V E S E R I S™

**Terad₃
BLOX™**

Colecalciferol
Rodenticida / Bloques de cebo

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO
Colecalciferol: 0.075%

(3β, 5Z, 7E) -9,10-secocholesta-5,7,10 (19) -trien-3-ol
(Equivalente a 0.75 g i.a./kg)

INGREDIENTES INERTES: 99.925%

Colorantes, potenciadores, atrayentes alimenticios,
protector de humedad y conservadores

TOTAL: 100.000%

Número de registro sanitario: RSCO-RODE-517-X0006-449-0-075

CONTENIDO NETO: 8.17 kg



Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL
DE PLAGAS, S.A. DE C.V.
Villa Primavera No. 640 Int. 3
Villas de Linda Vista
64540 Monterrey, Nuevo León.
R.F.C. SEC 910827 4P0
Tels: (55) 5271 2990 / 5515 8893
www.pestweb.com.mx | contacto@pestweb.com.mx

Formulado Por:

 **Bell**
LABORATORIES, INC. 3699 Kinsman Blvd.
Madison, WI 53704 U.S.A.
www.belllabs.com

6047 “HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

CULTIVO	PLAGA QUE CONTROLA	DOSIS	OBSERVACIONES
ZARZAMORA (SL) ARÁNDANO (SL) GROSELLA (SL) FRAMBUESA (SL) FRESA (SL) VID (SL) KIWI (SL)	RATA ALGODONERA (<i>Sigmodon toltecus</i>) RATA NEGRA (<i>Rattus rattus</i>)	De 1-3 kg/ha	En infestacion alta, coloque 100 g de producto por estacion de cebado o 'pulseo'. En infestacion media, coloque 50g de producto por estacion de cebado o 'pulseo'. Las estaciones deben colocarse al borde del cultivo. Utilice la dosis dependiendo de la infestacion de los roedores.

Intervalo De Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL= Sin Limite

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: “Al manejar y aplicar el producto utilice la ropa y equipo de seguridad indicados en el apartado de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO en la parte izquierda de esta etiqueta”. Abra el envase en forma de cubeta quitando la tapa superior, utilice guantes para evitar que los bloques de cebo adquieran olor a humano y coloque los cebos en la estación de cebado o “pulseo” en el accesorio para fijar el cebo en el interior de esta, como se recomienda en la tabla de instrucciones de uso.

CONTRAINDICACIONES: No manipule los bloques directamente con las manos. Evite que el cebo se impregne de olores que lo harán poco atractivo a la plaga.

INCOMPATIBILIDAD: No se recomienda mezclar el producto con otros agroquímicos.

MANEJO DE RESISTENCIA: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”

Número de lote:

Fecha de fabricación:

Fecha de caducidad:



PRECAUCIÓN

